

Reinigungs- und Desinfektionsplan (Beispiel)

Was Reinigen oder desinfizieren	Wie Art der Anwendung	Womit Arbeitsmittel (z.B. Desinfektionsmittel)	Wann Zeitpunkt, Rhythmus, Folge der hygienischen Maßnahmen	Spezielles Anmerkungen	Wer führt den Schritt aus?
Händehygiene	Händereinigung	Softaskin® pure	Bei Arbeitsbeginn und Arbeitsende, nach dem Toilettengang und sichtbar verschmutzten Händen, bei Verdacht auf Bakteriensporen / Parasiten nach vorheriger Händedesinfektion. Hände mit Wasser benetzen und mit ca. 3 ml Softaskin® pure mindestens 1 Minute waschen, danach gründlich abspülen und trocknen.	aus dem Wandspender	Tierarzt med. Personal
	Händedesinfektion Hygienische Händedesinfektion 30 Sek. Chirurgische Händedesinfektion 90 Sek.	Softa-Man® pure	Vor und nach dem Patientenkontakt / direkte Patientenumgebung vor aseptischen Tätigkeiten, nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material, vor Betreten von Risikobereichen, zwischen zwei OPs Hände und Unterarme mit ca. 3 ml benetzen und über die Mindesteinwirkzeit feuchthalten.	aus dem Wandspender	Tierarzt med. Personal
	Händepflege	Trixo®-lind	Bei Bedarf.	aus dem Wandspender	Tierarzt med. Personal
	med. Einmal-Untersuchungshandschuhe	Vasco® Nitril Sky-Blue	Bei Kontakt mit potentiell infektiösem Material oder bei Kontakt mit infektiösen Patienten.	-	med. Personal Reinigungspersonal
Haut des Patienten	OP Vorreinigung / MRE-Dekolonisation	Prontoderm® Foam	Haut und Fell mit genügend Schaum einreiben, Einwirkzeit beachten.	kein Abspülen notwendig; Prontoderm® Foam nicht mit Seifen udgl. mischen	Tierarzt med. Personal
	Desinfektion vor Injektionen / Punktionen 15 Sek.	Softasept® N	Vor Injektionen / Punktionen oder Blutabnahmen Softasept® N auf der Haut des Patienten auftragen (z.B. mit einem Tupfer).	aus der Sprühflasche	Tierarzt med. Personal
	Desinfektion vor OPs 2,5 Min.	Braunoderm®	Mit einem sterilen, in Braunol® getränkten Tupfer, mit Hilfe einer sterilen Kornzange den OP Bereich von innen nach außen einreiben, Einwirkzeit einhalten und Vorgang insgesamt 3-mal wiederholen.	aus der Sprühflasche	Tierarzt med. Personal
Wunde des Patienten	Wundreinigung- und Befeuchtung	ProntoVet® Lösung und Gel	Spülung von Wunden und Wundhöhlen, Lösen von eingetrockneten Verbänden (ProntoVet® Lösung), Befeuchtung von Verbänden und feuchte Wundabdeckung (ProntoVet® Gel).	-	Tierarzt med. Personal
Instrumente	Reinigung und Desinfizieren im Reinigungsbad 1%/5 Min.	Stabimed® fresh	Nach Eintreffen aus dem OP (max. 2 h Zwischenlagerung im Aufbereitungsraum) vollständig in Lösung eintauchen, vorhandene Arbeitskanäle füllen, nie über Nacht oder über das Wochenende in Lösung belassen.	Dosiertabelle für mögliche Konzentrationen und Einwirkzeiten beachten	med. Personal
	Entsorgung von spitzen, scharfen und zerbrechlichen Gegenständen	Medibox® 3 L	Bei Anfall sofort sicher umschlossen in den Abfall geben.	-	med. Personal Reinigungspersonal
Flächen	Bedienelemente med. technischer Geräte	Meliseptol® Wipes sensitive	Am Ende der Sprechstunde, bei sichtbarer Kontamination mit Blut, Stuhl, Urin Fläche vollständig benetzen. Einwirkzeit von 60 Sekunden einhalten.	-	med. Personal Reinigungspersonal
	Desinfizieren von kleineren Flächen (z. B. Tisch) Unverdünnt / 60 Sek.	Meliseptol® Wipes acute	Laufend; jedenfalls vor und nach Benutzung Fläche vollständig benetzen und einwirken lassen; kann auch für empfindliche Materialien (Ultraschallköpfe, Scherköpfe, Acrylglas) eingesetzt werden!	-	med. Personal Reinigungspersonal
	Reinigen und Desinfizieren von größeren Flächen (z. B. Käfig, Boden) 0,5% / 1 Std.	Hexaquart® pure	Bei Bedarf; jedenfalls vor Benutzung; Böden mind. 1 x täglich Käfig oder Boden mit einem mit Desinfektionslösung getränkten Tuch abwischen und Lösungsrückstand einwirken lassen.	Dosiertabelle für mögliche Konzentrationen und Einwirkzeiten beachten; Lösung im Eimer mind. 1 x täglich erneuern	med. Personal Reinigungspersonal