





Hautantisepsis

Wischdesinfektion



Hygienische Händedesinfektion und keimarme Untersuchungshandschuhe anziehen.



Scheren der Haare unmittelbar vor der Operation mit einer sauberen und scharfen Schermaschine. Vermeidung von Hautverletzungen (keine Nassrasur). Entfernen der abgeschnittenen Haare mit einem Papiertuch oder einem Staubsauger (berührungslos).



Antiseptikums von Schmutz und Talg gereinigt und dekontaminiert werden. Dafür die Haut mit Protoderm® Foam einreiben und reinigen.

Die Haut sollte vor dem Auftragen des

Ziel = Entfernung grober Verschmutzungen und der transienten Hautflora.



Nach einer Minute können die Reste des Schaums mit einem sauberen Tuch entfernt werden.

Der Patient wird in den OP verbracht und für die OP sicher gelagert.



Vor der Antiseptik müssen die Hände desinfiziert und es sollten sterile OP Handschuhe angezogen werden.



Aseptik: Ziel 1) schnelle und deutliche Reduzierung der residenten Hautflora und 2) langanhaltenden (remanenten) aseptischen Effekt.

Die Haut mit Braunoderm® getränkten, steilen Tupfern und einer sterilen Kornzange 30 Sekunden vom Zentrum zur Peripherie einreiben.

Hautantisepsis

Wischdesinfektion



Die Einwirkzeit abwarten.



Die Haut erneut mit Braunoderm® getränkten steilen Tupfern und der sterilen Kornzange 30 Sekunden vom Zentrum zur Peripherie einreiben. Diesen Vorgang insgesamt 3 mal durchführen.



Nach abwarten der Einwirkzeit kann der Patient durch den Chirurgen steril abgedeckt werden.



Mehr Informationen, dieses Poster und noch vieles mehr finden Sie unter: www.bbraun-vetcare.de/indeinenhaenden

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | info@bbraun-vetcare.de | www.bbraun-vetcare.de

Herzlichen Dank – Die Bilder wurden mit freundlicher Unterstützung der Kleintierspezialisten Frontier GmbH in Hergolding aufgenommen.